Zecche e piroplasmi: un rischio anche per l'Italia nord-orientale?

Cassini Rudi

***Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie,
Università degli Studi di Padova***

***Le zecche: pericolo concreto per l'uomo?
San Bonifacio (VR), 13 giugno 2009***

Le piroplasmosi animali

**Emo-protozoi intra-eritrocitari
trasmessi da zecche, cosmopoliti,
di grande importanza economica
a emergente carattere zoonosico**

Le piroplasmosi animali

Phylum: Protozoa
Subph.: Sporozoa (Apicomplexa)
Classe: Piroplasmidia
Genere: Babesia e Theileria

NO fase pre-eritrocitaria

Trasmissione trans-ovarica (verticale)

Fase pre-eritrocitaria

NO trasmissione trans-ovarica (verticale)

Babesia

Theileria

Genere *Babesia*

B. divergens

B. bovis

B. bigemina

B. major

B. motasi

B. ovis

B. crassa

B. divergens

B. microti

B. odocoilei

B. capreoli

B. jakimovi

B. caballi

B. equi
(*Theileria*)

B. perroncitoi

B. trautmanni

B. canis canis

B. canis gibsoni

B. canis vogeli

B. felis

Genere *Theileria*

T.parva

T.annulata

T.buffeli

T.hirci

T.ovis

T.cervi

T.equi

??

T.annae

??

Babesiosi umana

- **Casi umani**

- **In Europa:**

- **Primo caso: ex-Yugoslavia nel 1957**
 - **31 casi: più di metà dal 1985**
 - **La maggior parte riconducibili a *B. divergens***

- **Negli USA:**

- **Primo caso nel 1969: babesiosi da *B. microti* (Nantucket, Massachusetts, USA orientali)**
 - **Altri 13 casi tra il 1973 e il 1976 (Nantucket fever)**
 - **Dal 1982: più di 300 casi (Massachusetts, New York, Connecticut, Wisconsin, Minnesota)**
 - **La maggior parte riconducibili a *B. microti***
 - **...ma, alcuni casi (USA occidentali) riconducibili a specie di animali domestici o selvatici (WA1, CA1)**

Babesiosi negli USA: l'isola di Nantucket, un laboratorio naturale

Babesiosi negli USA: l'isola di Nantucket, un laboratorio naturale

- **La 'febbre di Nantucket':**

- **Quale specie:**

- *B. microti*, la babesia dei roditori

- **Quale serbatoio:**

- Whitefooted Mouse (*Peromyscus leucopus*): 40.9%
 - Meadow vole (*Microtus pennsylvanicus*): 21.2%
 - Cottontail rabbit (*Sylvilagus floridanus*): 3.8%
 - I cervidi non sono ospiti competenti per *B. microti*, anche se sono importanti nel mantenere le popolazioni di zecche

Spielman et al. (1981) Am J Trop Med Hyg, 30: 560-565

Babesiosi negli USA: l'isola di Nantucket, un laboratorio naturale

- **La 'febbre di Nantucket':**

- **Quale vettore?**

- Solo due specie di zecche sono state trovate sui micro-mammiferi dell'isola: *Ixodes scapularis* e *Dermacentor variabilis*
- La popolazione di *I. scapularis* era il doppio di quella di *D. variabilis*
- La biologia di *I. scapularis* con picco di ninfe in primavera e picco di larve in tarda estate assicura un efficiente mantenimento dell'infezione da *B. microti*

Spielman et al. (1984) Yale J Biol Med, 57: 507-513

Babesiosi umana: situazione in EU

- **Caso umano italiano (1998)**

- **Anamnesi** Herwaldt *et al.* (2003) *Emerg. Infect. Dis.* 9: 942-948

- **Uomo, 55 anni, splenectomizzato**

- **Analisi filogenetica (anche per caso austriaco)**

- ***Babesia* EU1 (molto simile, ma diverso da *B. odocoilei*, formano gruppo affine a *B. divergens*)**

- **Caso portoghese (1998)**

- **Anamnesi**

- **Uomo, 66 anni, splenectomizzato**

- **Analisi filogenetica**

- ***B. divergens***

Centeno-Lima *et al.* (2003) *Trop. Med. Int. Health* 8: 760-764

Babesiosi in EU: rischio zoonosico?

- **Domande a cui rispondere:**
 - **Quale specie di *Babesia*...like?**
 - *B. microti*, *B. divergens*, *Babesia* WA1, CA1, MO1, **EU1**
 - **Quale serbatoio?**
 - **Domestici, selvatici...**
 - **... quali selvatici?**
 - **Quale vettore?**
 - **USA: *Ixodes scapularis* per *B. microti***
 - **EU: *Ixodes ricinus* per *Babesia* EU1 ??**

51 caprioli e 30 cervi (Slovenia)

B. divergens:

76,5% nel capriolo

16,7% nel cervo

Babesia EU1:

21,6% nel capriolo

Duh *et al.* (2005)

Emerg. Infect. Dis. 11: 1121-1123

Indagine in Italia nord-orientale

- **Parte di un PRIN 2004 sulle babesiosi animali**
- **Area di studio: zone collinari e montane di Veneto e Friuli Venezia Giulia**
- **Tra 2005 e 2006 campionati: 116 bovini, 83 ovini, 24 caprini e 81 ruminanti selvatici di diverse specie (49 caprioli)**

Metodologia

- **Su tutti i campioni:**
 - **Striscio di sangue (quando possibile)**
 - **PCR per la ricerca di piroplasmi (CRYPTO-F e RLB-R2)**
- **Campioni positivi alla PCR:**
 - **sequenziati e testati verso sequenze del gene 18S rRNA di *Babesia* spp. e *Theileria* spp. (database GenBank, EMBL e DDBJ) utilizzando BLAST**
- **Campioni bovini:**
 - **analizzati sierologicamente tramite test IFI per *B. bigemina* e *B. bovis* (Fuller Lab., Fullerton, California)**

Risultati (zecche)

- Zecche (172): analisi biomolecolari

Ospite (n)	Zecche (n)	Positive (n) alla PCR
Bovini (6)	<i>Ixodes ricinus</i> (7)	0
Ovini (1)	<i>R. bursa</i> (1)	0
Camosci (1)	<i>Ixodes ricinus</i> (3)	0
Daini (1)	<i>Ixodes ricinus</i> (5)	0
Cervi (2)	<i>Ixodes ricinus</i> (9)	0
Caprioli (33)	<i>Ixodes ricinus</i> (141)	<i>Theileria</i> spp. (2)
	<i>Ha. concinna</i> (3)	0
	<i>D. marginatus</i> (3)	0

Risultati

- **Nessun ovino e nessun caprino è risultato positivo**
- **Solo 1 bovino positivo allo striscio**
- **Siero-prevalenze:**
 - **53,4% (62/116) per *B. bovis***
 - **10,3% (12/116) per *B. bigemina***
 - **Titoli tendenzialmente bassi**
- **Positivi alla PCR**
 - **bovini (21/110)**
 - **ruminanti selvatici (29/81)**

Campione PD/254/BV (Friuli)

Risultati

- **Positivi alla PCR (solo una parte riconducibile a *Babesia* spp.)**
 - **bovini (17/21/110)**

• <i>B. microti</i> (1)	14,5%
• <i>B. microti</i> -like (15)	
• <i>B. divergens</i> (1)	
 - **ruminanti selvatici (24/29/81)**

• <i>B. divergens</i> -like (21)	27,2%
• <i>Babesia</i> EU1 (1)	
• <i>Babesia ovis</i> (2)	
- **Rimanenti campioni attribuibili al genere *Theileria***

Risultati

- **Indagine sierologica su popolazione umana a rischio (Provincia di Verona)**
 - **Personale forestale (0/26)**
 - *B. microti*
 - **Allevatori (2/5)**
 - *B. microti*
 - *B. equi*
 - *B. bovis*

Indagine sierologica in Svizzera orientale

5/396 (1,5%) sieri umani positivi

Foppa *et al.* (2002) *Emerg. Infect. Dis.* 8: 722-726

Risultati

- **Indagine biomolecolare su pool di zecche da prelievi ambientali (Provincia di Verona e Vicenza) raccolte nel 2006 (*I. ricinus*)**
 - **Verona (0/29)**
 - **Vicenza (4/31)**
 - ***Babesia* EU1**

Babesia EU1 in *I. ricinus* segnalata in:

Slovenia - Duh *et al.* (2005) J Parasitol., 91:463-465

Svizzera - Hilpertshauser *et al.* (2006) Appl Environ Microbiol., 72: 6503-6507

Olanda – Nijhof *et al.* (2007) Vector Borne Zoonotic Dis., 7:585-595

Dimostrata la trasmissione sperimentale di *Babesia* EU1 in *I. ricinus*:

Bonnet *et al.* (2009) Vet Res., 40: 21epub

Siti campionamento zecche positivi

Considerazioni

- **circolazione notevole di *Babesia* spp. nelle popolazioni di bovini e di ruminanti selvatici**

Pietrobelli *et al.* (2007) *Parassitologia*, 49: 33-38

- **ritrovamento di *Babesia* EU1 (agente responsabile dell'unico caso umano italiano) in un capriolo della Provincia di Verona**

Tampieri *et al.* (2007) *Vector Borne Zoonotic Dis.*, 8: 667-674

- **positività delle zecche (*I. ricinus*) a *Babesia* EU1 in un'area limitrofa**

Dati non pubblicati

Considerazioni

- ritrovamento di *B. microti* nel bovino: di cosa si tratta?
- positività sierologica verso *B. microti* nell'uomo: di cosa si tratta?
- molti isolati riconducibili ai gruppi *B. microti-like* (bovino) e *B. divergens-like* (selvatici), entrambi possibili responsabili di zoonosi

... per concludere

- **Controllo (misure “anti-zecca”)**
- **Sorveglianza**
- **Ricerche future:**
 - **Tassonomia dei piroplasmi:**
 - **Aspetti bio-molecolari**
 - **Aspetti antigenici**
 - **Aspetti ecologici**
 - **Studi sul vettore**
 - **Studi sulle possibili specie serbatoio**
 - **Migliorare capacità diagnostiche**

I vettori e le malattie trasmesse sono in aumento...

...prepariamoci a saperli affrontare!

Grazie per l'attenzione!